

DOVVO® 375 SC LEPTOSAR® 200 SL TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW ZAROLIS®



Ciech
Sarżyna

WIOSENNA OCHRONA RZEPAKU


- KOMPLEKSOWA**
ochrona fungicydowa
połączona z regulacją
pokroju roślin
- SKUTECZNA**
zwalcza kluczowe
choroby i szkodniki
- ELASTYCZNA**
łatwy i szeroki dobór
rozwiązań i terminów
stosowania



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

CIECH Sarżyna S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarżyna, tel. (17) 24 07 111

PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO



BBCH

JESIEŃ

WIOSNA

LEPTOSAR®

200 SL


NOWOŚĆ



SKUTECZNY
NIEZAWODNIE CHRONI
PLANTACJE W OKRESIE
WEGETACYJNYM

UNIWERSALNY
SZEROKA REJESTRACJA
W BLISKO 50 UPRAWACH

KOMPLEKSOWY
ZWALCZA SZKODNIKI
W RÓŻNYCH STADIACH
ROZWOJOWYCH



ACETAMIPRYD
200 g/l

DOVVO®

375 SC



DIFENOKONAZOL
250 g/l

PAKLOBUTRAZOL
125 g/l



KLUCZOWY
ZASTOSOWANY JESIENIĄ ORAZ WIOSNĄ
ZWALCZA CHOROBY O NAJWIĘKSZYM
WPŁYWIE NA POTENCJAŁ
PLONOTWÓRCZY

KOMPLETNY
POŁĄCZENIE DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH
SIĘ SUBSTANCJI AKTYWNYCH

KONKRETNY
REGULUJE POKRÓJ ROŚLIN, WPŁYWAJĄC
NA JAKOŚĆ ORAZ OGRANICZA STRATY
ZWIĄZANE Z WYLEGANIEM

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	0,2 - 0,3 l/ha	30 - 59 od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania
	słodyszek rzepakowy	0,15 - 0,3 l/ha	50 - 59 od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania
	chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik		59 - 71 od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość

UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	regulacja wzrostu, przeciwdzia- łanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), czerń krzyżowych	0,3 l/ha	14 - 16 jesienią - w fazie 4-6 liści
	regulacja wzrostu, przeciwdzia- łanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepa- ku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)	0,35 l/ha	31 - 55 wiosną - w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH KUKURYDZY,
ZBÓŻ OZIMYCH I JARYCH, UPRAWACH WARZYWNICZYCH ORAZ SADOWNICZYCH

DOVVO® 375 SC ZAREJESTROWANY JEST TEŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH
MAŁOOBSZAROWYCH: LEN, MAK, RZEPKI I INNE

MICOSAR®

60 SL




WIELOKIERUNKOWY
DZIAŁA SYSTEMICZNIE; DO STOSOWANIA
ZAPOBIEGAWCZEGO, INTERWENCYJNEGO
I WYNI SZCZAJĄCEGO

EFEKTYWNY
REGULUJE POKRÓJ RZEPAKU
I UTRZYMUJE JEGO ZDROWOTNOŚĆ

NIEZAWODNY
ZWALCZA NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY
RZEPAKU OZIMEGO

ZAROLIS®






NOWOŚĆ

SKUTECZNY
ZWALCZA I CHRONI RZEPAK
PRZED CHOROBYMI GRZYBOWYMI

KOMPLETNY
NIE WYMAGA STOSOWANIA INNYCH
PRODUKTÓW

NIEZAWODNY
SKUTECZNOŚĆ SUBSTANCJI
POTWIERDZONA WIELOLETNIĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza	jesień 0,7-1,0 l/ha	14 – 16 jesienią – w fazie 4–6 liści rzepaku
		wiosna 1,0 l/ha	30 – 51 wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka

UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych	1,0 l/ha	65 – 69 od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia
 RZEPAK JARY	czerń krzyżowych, szara pleśń		

MICOSAR® 60 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ
ORAZ JAREJ

AZOKSAR[®]



SUPER 250 SC



UNIWERSALNY
ZAREJESTROWANY
W 23 GŁÓWNYCH UPRAWACH
POŁOWYCH I KILKUDZIESIĘCIU
UPRAWACH MAŁOBSZAROWYCH


WIELOKIERUNKOWY
MOŻNA GO STOSOWAĆ
W RÓŻNYCH PROGRAMACH
OCHRONY

EKONOMICZNY
EFEKTYWNY I SKUTECZNY
W DZIAŁANIU

UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	0,8 l/ha	60 – 69 w fazie kwitnienia rzepaku

TARCZA[®] ŁAN

EXTRA 250 EW



WSZECHSTRONNY
W RZEPAKU OZIMYM OGRANICZA PRESJĘ
CHORÓB I DZIAŁA JAKO REGULATOR
WZROSTU – STOSOWANY JESIENIĄ
POPRAWIA PRZEZIMOWANIE,
A STOSOWANY WIOSNĄ POPRAWIA JAKOŚĆ
NASION I UŁATWIA ZBIÓR RZEPAKU

EFEKTYWNY
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W NISKIEJ DAWCE
DZIĘKI ODPOWIEDNIYM KOFORMULANTOM

KOOPERATYWNY
Z MIESZANINAMI OPYSKOWYMI, CO
ROZSZERZA SPEKTRUM ZWALCZANYCH
CHORÓB I WPROWADZA KOLEJNE
MECHANIZMY DZIAŁANIA

ELASTYCZNY
MA SZEROKIE OKNO APLIKACJI, A TO
UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE WSZYSTKICH
WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI AKTYWNEJ

UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
	czerń krzyżowych	0,5-0,75 l/ha	14 – 18 jesienią – w fazie 4–8 liści
 RZEPAK OZIMY	sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych	0,75-1,0 l/ha	30 – 31 wiosną – w początkowej fazie wzrostu pędu głównego
	czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa	1,0-1,25 l/ha	59 – 65 od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych


AZOKSAR[®] SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH:
ZBOŻA OZIME I JARE, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELU INNYCH

TARCZA[®] ŁAN EXTRA 250 EW ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ
W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA I DAWKOWANIA PRODUKTÓW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. (17) 24 07 503
sprzedaz.sarzynna@ciechgroup.com

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.CIECHAGRO.PL



ZESKANUJ KOD QR
i porozmawiaj
z przedstawicielem
działającym na terenie
Twojego regionu



CIECH Sarzyna S.A.
ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzynna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl

Śledź nas na:



www.ciechagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.